

Atención de enfermería basada en el autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis: revisión sistemática

Self-care-based nursing care in hemodialysis patients: systematic review

- ¹ Jadira del Cisne Guerrero Guerrero  <https://orcid.org/0000-0001-9271-0090>
Maestría en Gestión del Cuidado del Posgrados de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador
jadira.guerrero.29@est.ucacue.edu.ec
- ² Francly Hollminn Salas Contreras  <https://orcid.org/0000-0003-2207-1953>
Maestría en Gestión del Cuidado del Posgrados de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador
franholdsac@yahoo.es
- ³ María Gabriela Morgado Tapia  <http://orcid.org/0000-0003-0216-3666>
Maestría en Gestión del Cuidado del Posgrados de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador
gmorgado@unab.cl



Artículo de Investigación Científica y Tecnológica

Enviado: 28/01/2022

Revisado: 11/02/2022

Aceptado: 04/03/2022

Publicado: 10/07/2022

DOI: <https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v5i3.2240>

Cítese:

Guerrero Guerrero, J. del C., Salas Contreras, F. H., & Morgado Tapia, M. G. (2022). Atención de enfermería basada en el autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis: revisión sistemática. *Anatomía Digital*, 5(3), 212-228. <https://doi.org/10.33262/anatomiadigital.v5i3.2240>



ANATOMÍA DIGITAL, es una Revista Electrónica, Trimestral, que se publicará en soporte electrónico tiene como misión contribuir a la formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica que sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos en la sociedad. <https://anatomiadigital.org>
La revista es editada por la Editorial Ciencia Digital (Editorial de prestigio registrada en la Cámara Ecuatoriana de Libro con No de Afiliación 663) www.celibro.org.ec

Esta revista está protegida bajo una licencia Creative Commons AttributionNonCommercialNoDerivatives 4.0 International. Copia de la licencia: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Palabras claves: hemodiálisis, atención de enfermería, autocuidado, insuficiencia renal crónica.

Keywords: hemodialysis, nursing care, self-care, chronic renal insufficiency.

Resumen

En el ámbito de la salud el personal de enfermería se destaca como la mayor red de apoyo manteniendo una relación directa con los pacientes con enfermedades renales crónicas que enfrentan tratamientos de hemodiálisis. El **objetivo** principal fue examinar en la literatura científica sobre la atención de enfermería basada en el autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. La investigación se realizó a través de la revisión sistemática basada en el PRISMA. Se realizó la búsqueda de artículos científicos actualizados desde hace quince años atrás usando palabras claves en bases de datos como: Scopus, Redalyc y Scielo. **Resultados:** En los 20 artículos seleccionados se evidencio como es la atención de enfermería en pacientes con tratamiento de Hemodiálisis. Con el siguiente artículo se espera dar a conocer al personal de salud sobre Atención de Enfermería basada en el autocuidado en Pacientes con Tratamiento de Hemodiálisis para lograr una intervención acorde a los requerimientos de cada uno de estos pacientes. **Conclusión:** Se concluye que la atención de enfermería es la base fundamental para que los pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis lleven una buena calidad de vida con respecto a su autocuidado.

Abstract

In the health care setting, the nursing staff stands out as the major support network maintaining a direct relationship with patients with chronic kidney disease facing hemodialysis treatments. The main objective was to examine in the scientific literature on nursing care based on self-care in patients with hemodialysis treatment. The research was conducted through systematic review based on PRISMA. A search for updated scientific articles from fifteen years ago was carried out using keywords in databases such as: Scopus, Redalyc and Scielo. **Results:** The 20 selected articles showed how nursing care is provided to patients undergoing hemodialysis treatment. The following article is expected to inform health personnel about nursing care based on self-care in patients with hemodialysis treatment in order to achieve an intervention according to the requirements of each of these patients. **Conclusion:** It is concluded that nursing care is the fundamental basis for renal patients with hemodialysis treatment to have a good quality of life with respect to their self-care.

Introducción

La insuficiencia renal crónica es un daño progresivo e irreversible del funcionamiento renal, determinándose la afección mediante el filtrado glomerular manifestado por un FG <60 ml/min/1,73 m², cuando existe pérdida gradual de la función renal con un grado del 20% se requiere de algún tipo de diálisis sea esta hemodiálisis o diálisis peritoneal. Es importante evitar que se presenten complicaciones en estos pacientes ya que aumentan su morbi-mortalidad he aquí la intervención de enfermería debe ser de manera eficiente, eficaz y segura (1–4). En la última década la aparición e incremento de las enfermedades crónicas constituyen una gran amenaza a nivel mundial para los países industrializados y para los que están en vías de desarrollo; según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades crónicas representan el 75% del gasto sanitario y en la actualidad estas personas sobreviven gracias al tratamiento dialítico (5,6).

La clasificación de los estadios de la insuficiencia renal crónica se describe de acuerdo con las guías internacionales de *KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes*, véase tabla 1). Generalmente el tratamiento para estos pacientes conlleva un daño en la dependencia funcional y por lo tanto los profesionales de enfermería son los encargados de mantener en óptimas condiciones para mejorar la calidad de vida hasta que este tenga un trasplante de riñón o fallezca. Por lo tanto, son sometidos a secciones de hemodiálisis 3 veces por semana de por lo menos 5 horas de duración. Existen complicaciones durante y después el tratamiento por lo que hay que manejarlas correctamente. el tratamiento de hemodiálisis consiste en un en este tipo de régimen terapéutico (7–9).

Tabla 1.

Clasificación de los Estadios de la Insuficiencia Renal Crónica

Clasificación de los Estadios de la Insuficiencia Renal Crónica		
Categorías del FG		
Categoría	FGb	Descripción
G1	> 90	Normal o elevado
G2	60-89	Ligeramente disminuido
G3a	45-59	Ligera a moderadamente disminuido
G3b	30-44	Moderada a gravemente disminuido
G4	15-29	Gravemente disminuido
G5	< 15	Fallo renal

Fuente: *KDIGO 2014* (10)

La razón de la investigación tendrá un enfoque en la Atención de Enfermería basada en el autocuidado se abordara de forma integral a pacientes sometidos al tratamiento de hemodiálisis la cual permitirá que estos profesionales estén correctamente informados y capacitados para tratar con pacientes con este tipo de tratamiento siendo estos los encargados de aplicar intervenciones basadas en juicios clínicos y métodos científicos para realizar acciones acorde al estado clínico de cada paciente, ya que la población anciana tiene mayores demandas y necesidades gracias al aumento de la esperanza de vida y de la cantidad de usuarios con patologías crónicas. la insuficiencia renal crónica es una patología que presenta factores propios que establecen la satisfacción, debido a que no solamente afecta al estado de salud físico sino también al económico, espiritual y social de la persona que la padece donde el sistema adaptativo fisiológicamente se ve afectado por estímulos tanto positivos como negativos; más aún cuando se realizan sesiones de hemodiálisis como tratamiento estricto para el mejoramiento de su calidad de vida (11,12).

Partiendo de esta problemática en la actualidad el personal de enfermería se destaca como la mayor red de apoyo manteniendo una relación directa con los pacientes con enfermedades renales crónicas que enfrentan tratamientos de hemodiálisis; actúan como fuente principalmente de amor, apoyo y sobre todo brindan cuidados individualizados adecuados para un mayor bienestar con respecto a su salud; pero debido al déficit que existe en las Instituciones de Salud en cuanto a la aplicación de intervenciones basadas en las teorías de enfermería no se realizan correctas intervenciones al paciente (12–15)

Hernández en el 2005 (16) y Pérez en el 2012 (17), señalaban que en los últimos años el tratamiento de la Insuficiencia Renal Crónica han tenido importante progresos técnicos y que las acciones que permiten conservar una adecuada calidad de vida y salud no se originan con el individuo sino que deben aprenderse y también se relacionan con la calidad de satisfacción que el paciente tenga; por lo tanto el autocuidado de un individuo son actividades que se realizan para sí mismo ósea para su propio bienestar; en razón de que, todos poseemos la capacidad de cuidarnos y esto se lo aprende a lo largo de la vida; lo cual esto, como personal de salud nos proporciona nuestro talento para transmitir información acerca de los cuidados que deben tener los pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis. Es necesario que el personal de enfermería brinde una atención integral basada en teorías de enfermería direccionadas a pacientes con tratamiento de hemodiálisis mediante apoyo continuo y a través de una intervención de manera eficiente, mediante actividades de tipo educativas y de motivación permanente ejerciendo primordialmente un rol de autocuidado del paciente.

Según el estudio “Valoración de las necesidades de atención psicológica en pacientes en hemodiálisis mediante indicadores de ansiedad y depresión” realizado por Rosales en el año 2016 (19), abordo que las acciones de enfermería deben identificar los problemas en

la prestación del cuidado y dar a conocer las pautas para desarrollar habilidades que fortalezcan el autocuidado en pacientes con este tipo de tratamiento ya que el desconocimiento que el individuo posee acerca de este tema no le permite llevar medidas de control de su salud para evitar algún tipo de complicación por inadecuado mantenimiento del catéter de diálisis, escasa adherencia al tratamiento de hemodiálisis, desconocimiento de la naturaleza inesperada de la enfermedad, falta de actitud y disposición tanto de la enfermera como del paciente las mismas que perjudiquen su estado de salud (18).

En relación al proceso de atención de enfermería es el sistema más utilizado por los profesionales de enfermería, ya que les permite mejorar el pensamiento crítico basándose en la aplicación de métodos científicos. El lenguaje estandarizado de diagnósticos enfermeros facilita la practica asistencial de enfermería es al NANDA: NIC y NOC. Algunos Autores Refieren en su artículo el valor que el profesional de enfermería debe darle a esta teoría de autocuidado con el único fin de contribuir con la salud del individuo mediante acciones orientadas al cuidado de sí mismo para cuidar su propia salud, reparar su enfermedad y hacer frente a sus consecuencias (4,13,19).

Con respecto al desarrollo sostenible en esta investigación se planteó como objetivo principal examinar en la literatura científica sobre la atención de enfermería basada en la teoría de Dorotea Orem en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. En función a ello, se determinó también los siguientes objetivos específicos describir la atención de enfermería basada en autocuidado y déficit de autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis y evidenciar los procesos de enfermería basados en el cuidado de pacientes con tratamiento de hemodiálisis.

Metodología

Se llevó a cabo un estudio mediante una revisión sistemática del método PRISMA (20).

Estrategias de búsqueda

La investigación fue a través de las siguientes bases de datos: Scopus, Redalyc y Scielo. En primer lugar, se seleccionaron aquellos que tuvieran relación con el tema de revisión sistemática atención de enfermería basada en el autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis, las palabras claves relacionados con los objetivos deseados, según los términos *Mesh* y *Decs*: “Atención de enfermería”, “hemodiálisis”, “Autocuidado”, y se hicieron las conexiones de estas con conectores Booleanos “AND” y “OR”. Posteriormente a una primera búsqueda se procedió a revisar cada artículo según título y resumen, aquellos que tuvieron la descripción de las variables clínicas y se expusiera la Atención de Enfermería basada en la Teoría de Dorotea Orem en Pacientes con Tratamiento de Hemodiálisis fueron incluidos. No obstante, en los casos en los cuales la

metodología de estudio no se encontró clara y los resultados fueron pocos precisos el artículo fue excluido.

Criterios de inclusión

La selección de artículos se realizó de la siguiente manera:

- ✓ Idiomas: se incluyeron estudios en español, inglés y portugués.
- ✓ Año de publicación: entre 17 años atrás.
- ✓ Artículos poblacionales de pacientes con Tratamiento de Hemodiálisis en los cuales se hubiesen comparados según la presencia o ausencia de Atención de Enfermería basada en la Teoría de Dorotea.
- ✓ Estudios de carácter cuantitativo.
- ✓ Calidad de los artículos.

Criterios de exclusión

Se excluyeron del estudio los artículos que no fueran del año de publicación de que se busca.

- ✓ Cartas al editor.
- ✓ Tesis de pregrado y posgrado
- ✓ Imposibilidad para recuperar el texto completo del artículo.
- ✓ Artículo repetido de una búsqueda anterior.

Procesamiento

Los datos obtenidos fueron resumidos mediante tablas, en las cuales se expusieron las principales características de la atención de enfermería basada en el autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis.

Se siguieron los siguientes pasos, en la primera etapa, se identificó el tema y la formulación de la pregunta de investigación a través de la estrategia Prevalencia o incidencia / teniendo como pregunta, ¿Cuál es la atención de enfermería basada en el autocuidado en pacientes sometidos a hemodiálisis, frente a las nuevas necesidades? ¿Cuáles son los procesos de enfermería basados en el cuidado de pacientes con tratamiento de hemodiálisis?

En la segunda etapa, se aplicaron los criterios de inclusión como artículos originales relacionados con la Atención de Enfermería basada en el autocuidado en pacientes con tratamiento de hemodiálisis, publicados en español, inglés, italiano y francés; con texto completo y online. El criterio de exclusión a los casos clínicos, serie de casos, estudios cualitativos, revisiones bibliográficas narrativas, revisiones bibliográficas sistemáticas, metaanálisis, estudios con metodologías no explicadas, cartas al editor.

En la tercera etapa se realizó la selección previamente expuesta al momento de la revisión de los artículos, si posterior a la lectura del resumen se escogió el artículo este fue revisado a profundidad.

Luego en la cuarta y quinta etapa se realizó la evaluación con más criterio de los estudios y la interpretación de los resultados obtenidos, para llegar a la sexta etapa donde se ha dado la forma de la discusión y síntesis de conocimiento; el resumen de los datos se colocó en una matriz elaborada por la autora, finalmente se compararon los datos obtenidos con los de otras investigaciones para poder estructurar el artículo de revisión definitivo.

Resultados

Una vez obtenida la información acerca de la atención de enfermería en pacientes con tratamiento de hemodiálisis, se encontraron 340 publicaciones de las cuales 20 eran de Scopus, 90 de Scielo y 230 de Redalyc. Posteriormente se excluyeron 200 artículos que no abordaban el tema. A continuación, se excluyeron las publicaciones que no correspondían al

estudio mediante la lectura de los resúmenes, obteniendo 100 quedando 40 artículos. Posteriormente al aplicar los criterios de elegibilidad para la lectura completa, se excluyeron 30 documentos. Y finalmente al analizarlos 6 eran artículos duplicados y 4 tenían otro objetivo para obtener el estudio de la muestra final con 20 artículos.

Figura 1.

Diagrama de flujo




Tabla 1:

artículos seleccionados para el estudio

Base	Autor	Año	Título	Pais	Autocuidado en su Tratamiento (Si/No)	Se utilizo el Pae (parte)
SCOPUS	Cantillo & Blanco (5)	2017	Agencia de autocuidado de la persona con enfermedad renal crónica en diálisis	Colombia	SI (80,2%)	Se usó la planificación de los cuidados de Enfermería, teniendo en cuenta los requerimientos de cada paciente

Tabla 1:
artículos seleccionados para el estudio (continuación)

Base	Autor	Año	Título	País	Autocuidado en su Tratamiento (Si/No)	Se utilizo el Pae (parte)
SCOPUS	Medina et al. (2)	2021	Influencia de la ansiedad y síntomas depresivos sobre la agencia de autocuidado en cuidadores de personas con enfermedad crónica	México	SI (15%)	-----
SCOPUS	Lucena et al. (13)	2018	Validation of the nursing interventions and activities for patients on hemodialytic therapy	Brasil	SI	Se usó el diagnostico planificación e intervención de los cuidados de Enfermería.
REDALYC	Contreras et al. (11)	2007	Estilos de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica (irc) en tratamiento de hemodiálisis	BOGOTÁ-COLOMBIA	SI	-----
REDALYC	Rosales et al. (19)	2016	Ética en los cuidados de enfermería a pacientes en tratamiento con hemodiálisis	Cuba	SI	La ética sirvió de guía para el diseño del plan de cuidados en todas sus etapas de valoración, planificación, ejecución y evaluación continua.
REDALYC	Montoya et al. (12)	2009	Variables asociadas a la satisfacción del paciente en una unidad de hemodiálisis	España	SI	SI todas las fases del PAE

Tabla 1:
artículos seleccionados para el estudio (continuación)

Base	Autor	Año	Título	País	Autocuidado en su Tratamiento (Si/No)	Se utilizo el Pae (parte)
REDALYC	Nagore et al. (7)	2014	Evolución del grado de dependencia funcional en pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis hospitalaria: un antes y un después	España	SI	Se usó los cuidados de enfermería de calidad, ajustados a las necesidades reales .
SCIELO	Arriola et al. (1)	2017	Prevalencia de insuficiencia renal crónica y factores asociados en el anciano joven.	España	-----
SCIELO	López et al. (14).	2014	Valoración de las necesidades de cuidados del paciente durante la hemodiálisis y su relación con el grado de dependencia	España	SI 69,3%	-----
SCIELO	Turrado et al. (3)	2017	Factores que influyen en la satisfacción del paciente de diálisis con enfermería	España	SI	SI todas las fases del PAE
SCIELO	Lima et al. (21)	2017	Diagnósticos e intervenciones de enfermería del dominio seguridad y protección de los pacientes en hemodiálisis	Brasil.	SI	Se usaron los diagnósticos e enfermería.
SCIELO	Salas & Fernández (18)	2019	Valoración de las necesidades de atención psicológica en pacientes en hemodiálisis mediante indicadores de ansiedad y depresión	España	NO	-----

Tabla 1:
artículos seleccionados para el estudio (continuación)

Base	Autor	Año	Título	País	Autocuidado en su Tratamiento (Si/No)	Se utilizo el Pae (parte)
SCIELO	Santamaría et al. (8)	2019	Percepción de comportamiento de cuidado de enfermería en adultos con terapia renal de diálisis peritoneal y hemodiálisis	Colombia	SI	Se usó los cuidados de enfermería
SCIELO	Hernández et al. (16)	2005	Satisfacción del paciente en una unidad de hemodiálisis: Objetivo de calidad asistencial en enfermería	España	SI	SI todas las fases del PAE
SCIELO	Poveda et al. (4)	2014	Diagnósticos de Enfermería en Pacientes Sometidos a Hemodiálisis	Brasil	SI	SI todas las fases del PAE
SCIELO	Partida et al. (9)	2019	El cuidado de enfermería a los enfermos renales en hemodiálisis: desafíos, dilemas y satisfacciones	México	---	Se usó los cuidados de enfermería de calidad, ajustados a las necesidades reales .
SCIELO	Cuevas et al. (22)	2019	Diseño y validación de un nuevo registro clínico de enfermería, para la continuidad de los cuidados y seguridad del paciente en hemodiálisis	España	SI	SI todas las fases del PAE
SCIELO	Pérez et al. (17)	2012	Satisfacción del paciente en una Unidad de Diálisis. ¿Qué factores modulan la satisfacción del paciente en diálisis?	España	SI	SI todas las fases del PAE

Tabla 1:

artículos seleccionados para el estudio (continuación)

Base	Autor	Año	Título	País	Autocuidado en su Tratamiento (Si/No)	Se utilizo el Pae (parte)
SCIELO	Periz et al. (6)	2010	Valoración de pacientes tratados con hemodiálisis según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia	España	SI 81%	SI todas las fases del PAE
SCIELO	Martínez & Caridad (15)	2016	Calidad de la atención de enfermería en el Departamento de Hemodiálisis del Policlínico “Giraldo Aponte Fonseca”	Cuba	----	SI todas las fases del PAE

Discusión

Se seleccionaron 19 artículos sobre la evidencia científica acerca de la atención de enfermería en pacientes con tratamiento de hemodiálisis. A continuación, se describe los estudios realizados:

En un estudio realizado en Colombia por Cantillo & Blanco en el 2017 (5), mencionan que el autocuidado de los pacientes que padecen de enfermedades renales crónicas y llevan tratamiento de hemodiálisis depende de variables como la percepción de su estado de salud las cuales alteran que el individuo tenga un correcto cuidado sobre su propia salud; dado que también expusieron que los pacientes de este estudio presentaron una alta capacidad de autocuidado debido a la intervención del personal de salud especialmente de los profesionales de enfermería ya que ellos brindan la información en relación al conocimiento que poseen de dicha enfermedad (5). Por otro lado en el 2021 Medina et al. (2) estudio realizado en México y Rosales et al. en el 2016 (19), coinciden con los autores anteriormente mencionados ya que manifestó que el autocuidado de estas personas con tratamientos dialíticos se ven afectados por factores como ansiedad y depresión perjudicando la percepción del estado de su salud actual lo que no les permite mantener una buena atención en su cuidado (2,18).

Por lo consiguiente en un estudio de la Revista Guacha de Enfermería en el 2017 Diagnósticos e intervenciones de enfermería del dominio seguridad y protección de los pacientes en hemodiálisis coinciden en que el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y la utilización del NANDA (*North American Nursing Diagnosis Association*) y NIC *Nursing Interventions Classification* son ejes primordiales en el autocuidado del paciente ya que aportan para que tome conciencia de su estado de salud y vea sus necesidades reales de acuerdo a su propio bienestar (4,13).

En el 2017 llevo a cabo un estudio de los “Estilos de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento de hemodiálisis” donde manifestó que la calidad de vida que tenga un paciente con este tipo de patología es la base fundamental para poder evaluar como este va a afrontar los cuidados con respecto a su salud y el grado de funcionamiento para la realización de actividades diarias, es por ellos que hoy en día es un concepto primordial el estudio de la calidad de vida del paciente para saber el tipo de atención integral que este va a tener consigo mismo (11). Por otra parte se manifestó en su estudio lo siguiente: los pacientes dialíticos enfrentan grandes cambios en su estilo de vida por lo que tienen que adaptarse a nuevos cambios en donde la participación de enfermería es de suma relevancia ya que favorece a la rehabilitación integral de los mismos (15).

Como resultado de un estudio realizado en el año 2016, sostuvo que en los últimos han se han realizado avances técnicos muy importantes para el tratamiento de enfermedades como la Insuficiencia Renal Crónica que han tenido excelentes resultados clínicos en el manejo de hemodiálisis; no obstante, aun se tiene el conocimiento de los factores influyentes como lo es la salud percibida en cuanto a los cuidados que brinda el personal de enfermería ya que cumple con requerimientos éticos debido a que esta alteración conlleva varios tratamientos paliativos que no ayudan a llevar una buena recuperación del paciente y es por ello que la intervención de enfermería con la identificación de sus diagnósticos reales y potenciales pueden potenciar la calidad de vida consiguiente un autocuidado correcto por parte del individuo (19). En el 2019 realizo un estudio en donde concordó con los autores mencionados anteriormente manifestando que aparte de los cuidados paliativos que deben tener estos pacientes presentan trastornos de tipo emocional y psicológico lo que se les dificulta su autocuidado y para ellos el personal de salud a cargo debe de mantener una buena relación para reciban el apoyo que necesitan (9).

En la investigación realizada en el 2009 menciona que factores como la edad, nivel de instrucción alcanzado, la vida laboral del paciente influye de manera prioritaria en el autocuidado; y también señala que la satisfacción del usuario en cuanto a su salud provenía de los cuidados y la enseñanza que le otorgaba el personal de enfermería lo que

les permite afrontar de manera adecuado su nueva condición de salud por el tratamiento de hemodiálisis que llevan a cabo por su enfermedad (12).

La investigación realizada sobre “evolución del grado de dependencia funcional en pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis hospitalaria un antes y un después” expuso que los pacientes con tratamiento de hemodiálisis al pasar el tiempo sufren una gran pérdida de la capacidad de llevar una buena calidad de vida ya que se vuelven dependientes ya sea de sus familiares como del personal de salud que está a cargo de su bienestar por lo que son los mismos que ayudan día a día al cuidado de su propia salud (7); coincidiendo con que manifiestan que la relación enfermera - paciente le conlleva a este último un grado muy alto de confianza y esto le conlleva a tener un conocimiento adecuado acerca de su enfermedad y como la puede ir sobrellevando día a día (3,14).

Por otra parte (8) expuso en su estudio acerca del “comportamiento de los pacientes de acuerdo a los cuidados brindados por enfermería” debido a que se enmarcan en la interacción familia-paciente-enfermería generando compromiso con la percepción y autocuidado de la salud de los usuarios con enfermedades crónicas renales que afrontan tratamientos de hemodiálisis; coincidiendo (16), en donde manifestó que la satisfacción del paciente está influenciada de manera determinante “el interés del personal de enfermería.

En la investigación acerca de “diseño y validación de un nuevo registro clínico de enfermería, para la continuidad de los cuidados y seguridad del paciente en hemodiálisis” señalo que proporcionarle la información adecuada al paciente con tratamientos de hemodiálisis ayudan con la continuidad de los cuidados adecuados que tengan estas personas (22). Es por ello, que en el año 2012 señalo que la enfermedad renal crónica tiene una atención sanitaria de manera prolongada por lo que es necesario la satisfacción de la atención que se les brinden en las casas de salud, atención que debe ser acorde a las necesidades de cada uno de los pacientes (17).

Conclusiones

- Se concluye que la atención de enfermería es la base fundamental para que los pacientes renales con tratamiento de hemodiálisis lleven una buena calidad de vida con respecto a su autocuidado. Es importante y necesario que el personal de enfermería brinde una atención integral basada en teorías de enfermería direccionadas a pacientes con tratamiento de hemodiálisis mediante apoyo continuo y a través de una intervención de manera eficiente, mediante actividades de tipo educativas y de motivación permanente ejerciendo primordialmente un rol de autocuidado del paciente.
- En el campo de la salud los profesionales de enfermería se destacan como la mayor red de apoyo manteniendo una relación directa con los pacientes con

enfermedades renales crónicas que enfrentan tratamientos de hemodiálisis; estos profesionales actúan como fuente principalmente de amor, apoyo y sobre todo brinda cuidados individualizados adecuados para un mayor bienestar con respecto a su salud. Enfermería cumple un rol muy importante en todo este proceso como principal ente; aportando una atención de calidad y transmitiendo buenas actitudes, costumbres, creencias y conductas relacionadas a la percepción del fenómeno salud – enfermedad; pero debido al déficit que existe en las Instituciones de Salud en cuanto a la aplicación de intervenciones basadas en las teorías de enfermería no se realizan correctas intervenciones al paciente.

Referencias Bibliográficas

- Arriola M, Rodríguez I, Nieto I, Mota R, Alonso F, Orueta R. Prevalencia de insuficiencia renal crónica y factores asociados en el “ anciano joven .” Rev Clínica Med Fam [Internet]. 2017;10(2):78–85. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1699-695x2017000200078
- Medina I, Carrillo A, Pantoja M, Torres R, Medina J, Cortez L. Influencia de la ansiedad y síntomas depresivos sobre la agencia de autocuidado en cuidadores de personas con enfermedad crónica. Univ Autónoma Coahuila [Internet]. 2021;21:204–15. Available from: <https://ojs.haaj.org/?journal=haaj&page=article&op=view&path%5B%5D=563>
- Turrado M, Pérez L, Domínguez C. Factors influencing the degree of satisfaction of the hemodialysis patient with nursing. Enferm Nefrol [Internet]. 2017;20(1):66–75. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-28842017000100009
- Poveda V, Alvez J, Santos E, Garcia A. Diagnósticos de Enfermería en Pacientes Sometidos a Hemodiálisis. Enferm Glob [Internet]. 2014;58–69. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412014000200003#:~:text=Los principales diagnósticos evidenciados en,y riesgo de desequilibrio electrolítico.
- Cantillo C, Blanco J. Agencia de autocuidado de la persona con enfermedad renal crónica en diálisis. Enferm Nefrol [Internet]. 2017;20(4):330–41. Available from: nfermerianefrologica.com/revista/article/view/4069
- Periz L, Arroyo C, Ibañez M. Valoración de pacientes tratados con hemodiálisis según la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Rev la Soc Esp Enferm Nefrol [Internet]. 2010;13(4):252–7. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-

13752010000400007

Nagore T, Gallego N, Huarriz A. Evolución del grado de dependencia funcional en pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis hospitalaria: un antes y un después. *Enfermería Nefrológica* [Internet]. 2014;17(a00101s1):16–7. Available from: <https://www.redalyc.org/pdf/3598/359835334006.pdf>

Santamaría N, Rodríguez K, Carrillo G. Percepción de comportamiento de cuidado de enfermería en adultos con terapia renal de diálisis peritoneal y hemodiálisis. *Enferm Nefrol* [Internet]. 2019;22(3):284–92. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-28842019000300007#:~:text=El 100%25 de los pacientes,carga baja para su familia.

Partida K, Tejada L, Chávez Y, Hernández O, Lozano M, Anguiano A. El cuidado de enfermería a los enfermos renales en hemodiálisis: desafíos, dilemas y satisfacciones. *Rev Da Rscola Enferm* [Internet]. 2019;1–9. Available from: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/yX3zxJHLnpR9XLXgvwzVH3d/?lang=es>

Gorostidi M, Santamaría R, Alcázar R, Gema F, Galcerán J, Goicoechea M, et al. Documento de la sociedad española de nefrología sobre las guías KDIGO para la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. *Nefrología*. 2014;34(3):302–16.

Contreras F, Esguerra G, Espinoza C, Gomez V. Estilos de afrontamiento y calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica (irc) en tratamiento de hemodiálisis. *Acta Colomb Psicol* [Internet]. 2007;10:169–79. Available from: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79810216>

Montoya M, C V, Colino M, Montes Y, Valle P, Prieto N, et al. Variables asociadas a la satisfacción del paciente en una unidad de hemodiálisis. *Rev la Soc Esp Enferm Nefrol* [Internet]. 2009;12(1):19–25. Available from: [https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-13752009000100004#:~:text=Menores niveles de satisfacción se,p %3C0%2C05\).](https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-13752009000100004#:~:text=Menores niveles de satisfacción se,p %3C0%2C05).)

Lucena A, Zys C, Costa M, Pires A, Monteiro V, Badin A. Validation of the nursing interventions and activities for patients on hemodialytic therapy. *Rev Gauch Enferm* [Internet]. 2018;38(3):e66789. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29538608/>

López M, Cantarero I, Gómez V, Casas R. Valoración de las necesidades de cuidados del paciente durante la hemodiálisis y su relación con el grado de dependencia.

- Enfermería Nefrológica [Internet]. 2014;17(4):283–90. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-28842014000400007
- Martínez Y, Caridad M. Calidad de la atención de enfermería en el Departamento de Hemodiálisis del Policlínico “Giraldo Aponte Fonseca.” MEDISAN. 2016;20(7):954–63.
- Hernández M, Ochando A, Mora J, Lorenzo S, Lopez K. Satisfacción del paciente en una unidad de hemodiálisis: Objetivo de calidad asistencial en enfermería. *Enferm Nefrol* [Internet]. 2005;8(2):90–5. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-13752005000200002
- Pérez T, Rodríguez A, Suárez J, Rodríguez L, García M, Rodríguez J. Satisfacción del paciente en una Unidad de Diálisis: ¿Qué factores modulan la satisfacción del paciente en diálisis? *Enfermería Nefrológica* [Internet]. 2012;15(2):101–7. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-28842012000200004
- Salas R, Fernández A. Assessment of needs of psychological care in hemodialysis patients using indicators of anxiety and depression. *Enferm Nefrol* [Internet]. 2019;22(2):177–88. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S2254-28842019000200177&script=sci_abstract&tlng=en
- Rosales J, Díaz J, Molina B, Chávez O. Ética en los cuidados de enfermería a pacientes en tratamiento con hemodiálisis. *Medisur* [Internet]. 2016;14:512–5. Available from: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000500006
- Bravo R. La declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas . *Declar Prism 2020* [Internet]. 2021;2009. Available from: https://ccamposhugf.files.wordpress.com/2021/04/prisma_2020_statement_definitivo-espanol-completo.pdf
- Lima L, Cavalcante M. Diagnósticos e intervenciones de enfermería del dominio seguridad y protección de los pacientes en hemodiálisis. *Enferm Glob* [Internet]. 2017;47:1–12. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412017000300001
- Cuevas M, González B, Bolaños E, Barrera M, De Almeida A, Jurado M, et al. Diseño y validación de un nuevo registro clínico de enfermería , para la continuidad de los

cuidados y seguridad del paciente en hemodiálisis. *Enferm Nefrol* [Internet]. 2019;22(2):168–75. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2254-28842019000200168

Conflicto de intereses

Los autores deben declarar si existe o no conflicto de intereses en relación con el artículo presentado.

Declaración de contribución de los autores

El artículo deberá acompañarse de una nota, que exprese la contribución de cada autor al estudio realizado.

El artículo que se publica es de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **Revista Anatomía Digital**.



El artículo queda en propiedad de la revista y, por tanto, su publicación parcial y/o total en otro medio tiene que ser autorizado por el director de la **Revista Anatomía Digital**.



Indexaciones

